

Diazinon vlooienband kat, 15% w/w.

Indicatie: Behandeling tegen vlooien (*Ctenocephalides felis*) bij kortharige katten.

Contra-indicaties: Niet gebruiken bij: zieke en herstellende dieren, dieren met een verminderde leverfunctie, dieren jonger dan 6 maanden, overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen, of overgevoeligheid voor andere organofosforverbindingen.

Bijwerkingen: Soms kan plaatselijke irritatie (jeuk, roodheid, haaruitval) optreden door het dragen van de band. Als dit gebeurt wordt aanbevolen de band te verwijderen tot de symptomen zijn verdwenen, zonder specifieke behandeling.

Zelden komen neurologische verschijnselen (kwijlen, trillende spieren, ataxie, epileptische aanvallen) voor. Zie ook rubriek speciale waarschuwingen. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: Kortharige kat.

Dosering en gebruiksaanwijzing: Eén halsband per dier. De werking van de band is optimaal na 2-4 dagen en duurt 6 maanden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening: Bevestig de band losjes om de nek van het dier. Knip het overtollige gedeelte van de band af, rekening houdend met eventuele groei van het dier.

Speciale waarschuwingen: Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: Een band die te strak om de nek van het dier zit, kan huidirritatie veroorzaken. Voorkom kauwen op de halsband.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: De band is waterbestendig. Water als gevolg van regen, zwemmen of wassen heeft geen invloed op de diazinon afgifte van de band.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient: Mensen met een bekende overgevoeligheid voor diazinon wordt afgeraden dit diergeneesmiddel te gebruiken. Aanraking met de huid tot een minimum beperken. Na aanbrengen handen wassen. In geval van inslikken, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiting of het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht of lactatie: Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de invloed van diazinon bij dracht en lactatie. Gebruik tijdens de dracht en lactatie wordt daarom afgeraden.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: Diazinon is een organofosforverbinding. Niet gelijktijdig gebruiken met andere organofosfor- of carbamaat insecticiden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antiodota): Bij katten wordt intoxicatie meestal (maar niet altijd) veroorzaakt door kauwen op de band. Symptomen: frequent urineren, diarree, overgeven, tranende ogen, kwijlen, lopende neus, hoesten, buitensporige bronchiale uitscheiding, pupil contracties, trillende spieren, verlies van reflexen, stuiptrekkingen, coma en cyanose. In zulke gevallen is het van belang het middel zo snel mogelijk van het dier te verwijderen. Neem bij ernstige vergiftigingsverschijnselen direct contact op met een dierenarts. Opmerking voor de dierenarts: in het geval van een ernstige intoxicatie wordt een behandeling met atropine aanbevolen.

Bewarings- en verwijderingsmaatregelen: Bewaren beneden 25°C en in de oorspronkelijke verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Inhoud: 1 halsband

Werkzame stof: Diazinon

Gehalte: 15% w/w

Registratienummer: REG NL 9281 - VRU

Laatste herzieningsdatum: 2 juni 2016

Registratiehouder:
Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte/Holland
Distributie:
Beaphar Nederland BV
Baronieweg 7
5321 JV Hedel