

Rengi kaybetmemek için tüy dökme öncesi ve tüy dökme zamanında renklendirici kullanımı kesilmemelidir. Kuşlar kırmızı dışkı yapabilirler, bu normaldir ve yeterince boyanın alındığını gösterir. Yukarıda bahsedilen miktarlardan fazlasını kullanmayın. Yüksek miktarlar vitamin depolanması ve detoksifikasyon gibi hayati önem taşıyan fonksiyonların gerçekleştiği karaciğerde depolanır. Kuşunuzda besleme sonrası mor renk gördüğünüzde renklendiriciyi hemen kesin ve mor renk kaybolana kadar vermeyin 7 gün sonra renklendirici kullanımı daha düşük dozajlarda yapılabilir. Paketler: 10 gr, 50 gr ve 500 gr.

Made by Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte/ The Netherlands  
α NL/90856

Distributed by:


- 🇳🇱 Beaphar Nederland B.V., Hedel
- 🇧🇪 Beaphar Belgium BVBA, Provenstraat 11, 8970 Poperinge
- 🇫🇷 Beaphar s.a.s., 2 Allée Vivaldi - 06800 Cagnes-sur-mer, France. Tél.: +33 (0)4 93 19 05 20
- 🇬🇧 Beaphar UK Ltd, Rook Tree Farm, Withersfield Road, Great Wrating, CB9 7HD
- 🇪🇸 🇫🇮 Beaphar Iberica, S.L.
- 🇮🇹 Pet Village Srl., Via Stradello, 35, 48124 Madonna dell'Albero (RA), Italy
- 🇬🇷 Beaphar Hellas E.Π.Ε. Κ.Παλαμά 14, Ν.Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ: 210 6728802
- 🇵🇱 Beaphar Polska Sp. z o.o., 84-240 Reda, ul. Ogrodników 2
- 🇹🇷 Anadolu Akvaryum ve Pet Urunleri San.Tic.As., Büyükbakkalköy Mahallesi Samandıra Yolu Sokak No:30., 34858 Maltepe / Istanbul / Turkey

**beaphar.com**

39720-B

**beaphar**®

**INTENSIEF**



🇳🇱 Voor de roodkleuring van alle soorten kleurvogels, zoals kleurkanaries, kneutjes, putters, kardinalen, flamingo's e.d. Onschadelijk, kleurt door op staart en vleugelpennen.

**Intensief rood niet door zaad vermengen.**

Kan gebruikt worden bij aanvullend diervoeder, zoals kracht- en eivoer. Dosering: 10g Intensief rood mengen met 1kg voer. Het mengsel dagelijks vers aanmaken. 2x per dag ter beschikking stellen, tijdens de broed- en ruiperiode 4x per dag. Intensief rood in ieder geval altijd tijdens de rui geven beginnend vanaf 1 week voor de rui. Echter,

de meeste kanariekwekers geven Intensief rood het hele jaar door.

Intensief rood kan ook opgelost worden in water. De dosering is dan 10 gram per liter (1 volle theelepels is ± 2 gram, 1 volle eetlepel is ± 5 gram). De oplossing moet dagelijks vers aangemaakt worden.

**Let op: zowel het voermengsel als de oplossing zullen rood opkleuren na het mengen met Intensief rood.**

Voor en tijdens de rui de toediening van Intensief rood niet onderbreken om kleurvermindering te vermijden. De ontlasting van vogels op Intensief rood kan rood gekleurd zijn. Dit is normaal en een teken van voldoende opname. Vermijd overdosering i.v.m. overbelasting van vitale functies van de lever (zoals vitamineopslag en ontgiftiging). Bovendien kan paarsverkleuring van huid en spieren optreden hetgeen van invloed is op de puntentelling. Verpakkingen: 10 g, 50 g en 500 g.

🇫🇷 Pour la coloration rouge de toutes les espèces d'oiseaux aux couleurs vives tels que les canaris colorés, les linottes, les chardonnerets, les cardinaux, les flamants roses etc. Produit non toxique, colore la queue et les plumes des ailes.

**Ne pas mélanger avec des graines.**

Le « Rouge Intense » peut se mélanger avec des aliments complémentaires, à raison de 10 g pour 1 kg de nourriture. Il faut administrer le mélange deux fois par jour, et au maximum quatre fois par jour pendant la période de couvaison et de mue. Au cours de la mue, il est indispensable de donner « Rouge Intense » à son oiseau pour obtenir de bons résultats, en commençant une semaine avant le début de la mue.

De nombreux éleveurs de canaris donnent « Rouge Intense » tout au long de l'année.

« Rouge Intense » peut également être dissout dans l'eau à raison de 10 g par litre (1 cuillère à thé pleine représente environ 2 g, 1 cuillère à café pleine représente environ 5 g). Il est recommandé de préparer ce mélange "frais" chaque jour dans l'eau ou la nourriture, pour éviter sa dégradation au cours du temps.

**Remarque : Une fois mélangé, « Rouge Intense » colore l'eau et la nourriture en rouge.**

Ne pas interrompre le traitement avant et pendant la période de mue pour éviter le ternissement du plumage. Les fientes des oiseaux qui consomment « Rouge Intense » peuvent être teintées de rouge, ce qui est parfaitement normal et ce qui indique que la prise est suffisante. Ne pas administrer de doses excessives qui seraient stockées dans le foie et qui représenteraient une charge pour les fonctions vitales (comme le stockage de vitamines et la détoxification de l'organisme). Si une coloration violette apparaît sur la peau de votre oiseau, arrêtez d'administrer « Rouge Intense » immédiatement jusqu'à ce que la coloration violette ait disparu. Au bout de sept jours, l'administration du « Rouge Intense » peut reprendre à un dosage inférieur. Conditionnements disponibles : 10 g, 50 g et 500 g.

🇬🇧 Beaphar Intensief effectively improves the red colour of the tail and wing feathers in all coloured birds, such as canaries, linnets, goldfinches, cardinals, flamingos etc. It is non toxic.

**Directions For Use:**  
**Do not mix with seed.**

Beaphar Intensief may be added to complementary food.

As a general rule, a mixture of 10 g of Beaphar Intensief with 1 kg of food is recommended. Alternatively, Beaphar Intensief may be added to the drinking water by dissolving 10 g in 1 litre of water (1 full teaspoon is approximately 2 g). The mixture should be prepared fresh daily. **Please note: both solution and feed mixture will colour red after mixing with Beaphar Intensief.**

For best results, starting at least one week before the moult and continuing during the moult, feed Beaphar Intensief twice a day. To avoid losing colour do not interrupt the feeding. During breeding, feed Beaphar Intensief up to a maximum of 4 times a day. (Most canary breeders offer Beaphar Intensief daily throughout the year).

Avoid giving amounts exceeding those stated above. Excess amounts will be stored in the liver, which places a load on vital functions like vitamin storage and detoxification. Should your birds show a purple colouring of the skin cease feeding Beaphar Intensief immediately until the purple colouring has disappeared. After a further seven days, feeding of Beaphar Intensief may be resumed at a lower dosage rate.

Birds fed Beaphar Intensief may pass red droppings. This is normal and indicates a sufficient intake. Pack sizes: 10 g, 50 g & 500 g.

🇩🇪 Für die Rotfärbung aller farbigen Vogelarten, wie farbige Kanarienvögel, Bluthänflinge, Distelfinken, Kardinäle, Flamingos usw. Beaphar Intensief ist nicht schädlich und färbt durch auf Schwanz und Flügelfedern.

**Fütterungsempfehlung:**  
**Beaphar Intensief nicht mit Samen vermischen.**  
Beaphar Intensief kann z.B. mit dem täglichen Futter vermischt werden. Empfohlen

werden 10 g Beaphar Intensief mit 1 kg Aufzuchtfutter zu vermischen. Zweimal täglich Beaphar Intensief verabreichen. Während der Brut und Mauser maximal 4-mal pro Tag. Das Futter sollte in jedem Fall während der Mauserzeit verabreicht werden. Viele Kanarienzüchter ziehen es jedoch vor, Beaphar Intensief während des ganzen Jahres zu füttern. Beaphar Intensief kann auch in Wasser aufgelöst werden. Die Dosierung beträgt dann 10 g auf 1 Liter (1 voller Teelöffel entspricht ± 2 g, 1 voller Eszlöffel entspricht ± 5 g). Die Lösung muss täglich frisch zubereitet werden. Dies gilt auch für die Mischung von Beaphar Intensief mit Eifutter oder Aufzuchtfutter.

**Achtung: Die Lösung und die Futtermischung färben sich rot, nachdem Sie diese mit Beaphar Intensief vermengt haben.**

Unterbrechen Sie die Verabreichung von Beaphar Intensief nicht während der Mauserzeit, um ein Verblässen der Farbe des Gefieders zu vermeiden. Die Exkremate von Vögeln, die Beaphar Intensief erhalten, können rot gefärbt sein. Dies ist ganz normal und zeigt, dass genügend Intensief aufgenommen wurde. Eine Überdosierung mit Beaphar Intensief sollte vermieden werden, da ansonsten die lebenswichtigen Funktionen der Leber (Vitaminspeicher und Entgiftungszentrale des Körpers) zu stark belastet würden. Sollte sich die Haut des Vogels violett färben, beenden Sie die Fütterung mit beaphar Intensief, bis die Violett-färbung verschwunden ist. Beaphar Intensief gibt es in den Gebinden: 10 g, 50 g und 500 g.

🇪🇸 Beaphar Intensief resalta sensiblemente el color de pájaros de factor rojo, tales como canarios, periquitos, jilgueros, cardenales, flamencos y otros. No tóxico, colorea desde la cola hasta las plumas de las alas.

**No debe mezclarse con semillas.**

**Modo de uso:** Intensief se puede mezclar con alimentos complementarios. Se aconseja mezclar 10 gramos de Intensief por cada 1 kg de alimento, la mezcla deberá ser fresca y realizarse diariamente. Suministrar la mezcla 2 veces al día y durante la época de incubación o de muda 4 veces, como máximo, al día. En cada caso de la época de muda, hay que suministrar siempre Intensief, empezando una semana antes del inicio de la misma. Sin embargo, la mayoría de los criadores aplica el producto durante todo el año.

Intensief también puede disolverse en agua. La dosificación en ese caso es de 10 gramos por litro (una cucharadita de café llena = aprox. 2 gramos; una cucharada = aprox. 5 gramos). Esta solución deberá ser fresca y realizarse diariamente.

**Aviso: tanto la solución como la mezcla con el alimento se coloreara de rojo con Intensief.**

Antes y durante la época de la muda no hay que interrumpir el suministro de Intensief con el fin de evitar una disminución de los colores. Los excrementos de los pájaros a los que se les ha suministrado pueden ser rojizos. Esto es normal y es un signo de que el cuerpo ha ingerido suficiente cantidad. Hay que evitar una sobredosificación porque sobrecargará las funciones vitales del hígado (tales como el almacenaje de vitaminas y desintoxicación). Pueden aparecer manchas moradas en la piel que desaparecen al cesar la alimentación con Intensief. Después de siete días se puede reiniciar la alimentación con Intesief en una dosis inferior. Formatos disponibles: 10 g, 50 g y 500 g.

Ⓟ Para a coloração vermelha de todos os tipos de pássaros coloridos, como por exemplo os canários, pintarroxos, pintassilgos, cardeais e flamengos. Não tóxico, colore a cauda e as penas de asas.

**Não misture Intensief com sementes.**

**Como usar:** Intensief pode ser misturado com alimentos complementares. Recomenda-se acrescentar 10 gramas de Intensief a 1 kg de alimento concentrado. Administre a mistura 2 vezes por dia. Durante o período de incubação e muda até 4 vezes por dia. De qualquer maneira deve-se administrar sempre Intensief durante a muda, começando 1 semana antes do início da muda.

A maior parte dos criadores administram Intensief durante o ano inteiro.

Intensief pode ser dissolvido em água. A proporção é de 10 gramas por litro (1 colher de chá cheia = ± 2 gramas, 1 colher normal cheia = ± 5 gramas). Esta solução tem que ser preparada diariamente. Isso também se aplica à mistura com alimento concentrado ou de ovos.

**Atenção por favor: tanto a solução como a mistura com papa de criação vão colorar de vermelho, depois de misturar com Intensief.**

Para evitar a descoloração, não se deve interromper a administração de Intensief antes da muda ou durante esta. É possível que os excrementos dos pássaros aos quais seja administrado Intensief adquiram uma coloração vermelha. Isto é normal e constitui um sintoma de que a quantidade administrada é suficiente. Deve evitar -se a sobredosagem, uma vez que isso implicaria na sobrecarga das funções vitais do fígado (como por exemplo a armazenagem de vitaminas e a eliminação de tóxicos). Além disso o excesso poderia ter como consequência uma coloração roxa da

pele e dos músculos, o que compro-meteria o número de pontos. Embalagens: 10 g, 50 g e 500 g.

ⓇIntensive Red migliora in modo sensibile la colorazione di tutti gli uccelli a fattore rosso, come i canarini, fanelli, cardellini, cardinali, fenicotteri ecc. Non-tossico, colora le piume della coda e delle ali.

**Non mescolare con i semi.**

Intensive Red può essere miscelato con alimenti complementari. Si consiglia di mescolare 10 grammi di Intensive Red con 1 kg. di pastone. Somministrare fresco 2 volte al giorno durante la muta e l'allevamento fino ad un massimo di 4 volte al giorno. I risultati saranno ottenuti solo fornendo Intensive Red durante la stagione della muta, iniziando almeno una settimana prima della stessa. Comunque, molti allevatori sommi nistrano Intensive Red tutto l'anno.

Intensive Red può essere aggiunto anche all'acqua da bere sciogliendo 10 grammi in 1 Litro di acqua (un cucchiaino da tè corrisponde approssimativamente a 2 grammi). Tutte e due le soluzioni devono essere preparate fresche quotidianamente.

**Importante: sia la soluzione acquosa che il pastone assumono una colorazione rossa dopo aver aggiunto Intensive Red**

Non interrompere la somministrazione di Intensive Red prima e durante la muta onde evitare la perdita di colore. Gli uccelli che hanno assunto il colorante possono presentare feci di colore rosso, ciò è normale e indica che è stato assunto il colorante in misura giusta. Evitare di somministrare dosi superiori a quelle sopra indicate. Non somministrare quantità eccessive di colorante onde evitare un sovraccarico delle

funzioni vitali del fegato come l'assimilazione di vitamine e la disintossicazione dell'organismo. Se gli uccelli presentano una colorazione porpora della pelle interrompere la somministrazione finché non è scomparso tale colore. Dopo sette giorni si può riprendere la sommi-nistrazione con un dosaggio inferiore. Confezioni: 10 g, 50 g e 500 g.

Ⓢ Το Intensief είναι ένα διατροφικό συμπλήρωμα το οποίο βελτιώνει αποτελεσματικά το κόκκινο χρώμα σε όλα τα χρωματιστά πτηνά όπως κόκκινα καναρίνια, καρδερίνες, καρδινάλιους, red siskins, καρποντάκους και άλλα πτηνά με κόκκινο πτέρωμα. Μη τοξικό.

**Οδηγίες χρήσης: Μην το ανακατεύετε με σπόρους.**

Το Beaphar Intensief μπορεί να προστεθεί σε συμπληρωματική τροφή. Κατά γενικό κανόνα, συνιστάται να αναμιγνύετε 10g Beaphar Intensief με 1kg τροφής. Εναλλακτικά, μπορεί να προστεθεί στο πόσιμο νερό διαλύοντας 10g Beaphar Intensief σε 1 λίτρο νερού (1 γεμάτο κουταλάκι του γλυκού είναι περίπου 2 g). Το μείγμα πρέπει να παρασκευάζεται φρέσκο καθημερινά.

**Σημείωση: τόσο το διάλυμα όσο και η τροφή θα έχουν κόκκινο χρώμα μετά την ανάμιξη με Beaphar Intensief.**

Για καλύτερα αποτελέσματα, ξεκινώντας τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν την περίοδο της πτερόρροιας και συνεχίζοντας κατά τη διάρκεια της, χορηγήστε το Beaphar Intensief 2 φορές την ημέρα. Για να αποφύγετε την απώλεια χρώματος, μην διακόψετε τη σίτιση. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χορηγήστε το Beaphar Intensief έως και 4 φορές την ημέρα. (Οι περισσότεροι εκτροφείς καναρινιών προσφέρουν Beaphar Intensief καθημερινά καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους).

Αποφύγετε να χορηγήσετε δοσολογίες που υπερβαίνουν αυτές που αναφέρονται παραπάνω. Οι υπερβολικές ποσότητες θα αποθηκευτούν στο ήπαρ, το οποίο επιβαρύνει ζωτικές λειτουργίες όπως η αποθήκευση βιταμινών και η αποτοξίνωση. Εάν τα πτηνά σας εμφανίσουν ένα μωβ χρωματισμό του δέρματος, σταματήστε να χορηγήστε το Beaphar Intensief αμέσως έως ότου εξαφανιστεί το μωβ χρώμα. Μετά από 7 επιπλέον ημέρες, η χορήγηση του Beaphar Intensief μπορεί να συνεχιστεί με χαμηλότερο ποσοστό δοσολογίας.

Τα πτηνά που τρέφονται με το Beaphar Intensief μπορεί να έχουν κόκκινα περιττώματα. Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει επαρκή πρόσληψη.Συσκευασίες: 10gr, 50gr, και 500gr.

Ⓟ Preparat przeznaczony jest do wybarwienia, zaakcentowania czerwonej barwy wszystkich kolorowych gatunków ptaków m. in. kanarków, makolągw, czyży i szczygłów (łuszczaków), kardynałów i flamingów. Nieszkodliwy, barwi przez ogon aż po skrzydła.

**NIE MIESZAĆ PREPARATU Z ZIARNEM !**

Intensief można mieszać z pokarmami uzupełniającymi. Zalecane jest wymieszanie 10 g preparatu z 1 kg karmy hodowlanej. Podawać świeżo sporządzone dwa razy dziennie; podczas wylęgu i pierzenia max. cztery razy dziennie. Spodziewany efekt można osiągnąć podając Intensief podczas pierzenia, rozpoczynając podawanie przynajmniej na tydzień przed tym okresem. Jednakże wielu hodowców kanarków zaleca stosować Intensief przez cały rok.

Preparat można również rozpuścić w ciepłej wodzie. (10 g preparatu w 1 l wody - 1 pełna łyżeczka odpowiada 2 g preparatu). Zarówno mieszaninę z karmą jak i z wodą należy przygotowywać na bieżąco, każdego dnia.

**Zarówno karma, jak i woda zabarwia się na kolor czerwony po zmieszaniu z preparatem.**

Przed i podczas pierzenia nie przerywać aplikowania preparatu, żeby uniknąć zblednięcia upierzenia. Odchody, wydalone przez ptaki mogą zostać również zabarwione. Jest to zupełnie naturalne i świadczy o tym, że preparat został odpowiednio wchłonięty. Należy unikać przedawkowania, gdyż może to doprowadzić do obciążenia wątroby, która odpowiada za ważne funkcje życiowe, magazynuje witaminy i uczestniczy w procesie odtruwania. W przypadku zaobserwowania fioletowego zabarwienia skóry należy przerwać podawanie preparatu aż do ponownego pojawienia się czerwonych wybarwień, a następnie stosować preparat w zmniejszonej dawce. Opakowania: 10 g, 50 g lub 500 g.

Ⓡ Kanarya, linnet, saka kardinal, flamingo gibi renkli kuşlarda kuyruk ve kanat tüylerinde kırmızı rengi arttıran renklendirici.

**KUŞ YEMİ TOHURLARIYLA KARIŞTIRMAYIN.**

Yoğunluk tamamlayıcı gıdalarla karıştırılabilir. Genel kural olarak 1 kg. yeme 10 gr. renklendirici katılabilir. Normal zamanda günde 2 kez, tüy dökme ve yavrulama zamanında günde 4 kez'e kadar taze hazırlanmış olarak veriniz. Sonuçlar sadece tüy dökme sezonunda besleme yolu ile alınır.

Tüy dökmeden 1 hafta önce başlamak gerekir. Renklendiriciyi 1 içme suyuna 10 gr. koymak suretiyle de (1 çay kaşığı aşağı yukarı 2 gr. gelir.) verebilirsiniz. İster suyuna katarak, ister mamasına ilave olarak veriniz fakat her iki karışımda günlük ve taze olarak hazırlanmalıdır.

**Önemli Not: Her iki solusyon ve yem karışımları yogun olarak karıştırıldıktan sonra kırmızı renk verecektir.**